

1. QU'EST-CE QUE LA RÉSISTANCE ?

La résistance est la **capacité naturelle et héritable** de certains individus d'une population adventice à **survivre** à un traitement herbicide qui aurait dû contrôler la population. Elle est due à une perturbation de l'interaction entre la substance active de l'herbicide et sa cible à l'intérieur de la plante adventice.


Chez les dicotylédones des céréales, il y a deux mécanismes de résistance :

■ **Modification de la cible (majoritaire) :**

la cible (dans la plante) de l'herbicide est différente en raison d'une mutation de son code génétique. La substance active ne peut plus interagir avec la cible.





■ **Détoxication de la molécule herbicide (minoritaire) :**

la substance active est dégradée en composés qui ne peuvent plus se fixer sur la cible.



2. QUELLES SONT LES DICOTYLÉDONES RÉSISTANTES EN CÉRÉALES ?


Les dicotylédones résistantes en France, identifiées à ce jour, sont résistantes aux inhibiteurs de l'ALS (HRAC 2) et aux herbicides «auxiniques» (HRAC 4). Leur biologie explique aussi leur capacité d'expansion.


Dicotylédone	Mécanisme de résistance*	Localisation**	Biologie	Evolution de la résistance**
 COQUELICOT	Modification de la cible (et détoxication) Groupes HRAC 2 et 4	64 départements (Principalement : 03, 10, 27, 31, 33, 37, 53, 76, 77, 78, 80)	1 cycle / an Levée groupée, plutôt automnale Longévité des graines : 40 ans	↗
 MATRICAIRE	Modification de la cible Groupe HRAC 2	19 départements (Principalement : 22, 35, 59, 62, 80)	Annuelle à bisannuelle, germination échelonnée, toute l'année Longévité des graines : 20 ans	↗
 STELLAIRE	Modification de la cible Groupe HRAC 2	3 départements (49, 59 et 76)	Peut faire plusieurs cycles par an Longévité des graines : 60 ans	→
 SÉNEÇON	Modification de la cible (et détoxication) Groupe HRAC 2	26 départements (Principalement : 14, 22, 29, 31, 33, 35, 41, 44, 49, 53, 56, 59, 69, 82, 85) Dans une moindre mesure : 01, 37, 50, 51, 58, 62, 69, 71, 72, 76, 86, 95)	Peut faire jusqu'à 5 cycles par an. Longévité des graines : > 10 ans	↗


* Connu à ce jour ** Source R4P 2024 ; répartition géographique disponible sur le site internet www.r4p-inra.fr


3. ÉCHEC DE DÉSHERBAGE ET SITUATION DE RÉSISTANCE

Face à un échec de désherbage, il convient de vérifier différents éléments avant de parler de résistance.

- 
 - Le produit utilisé devrait-il être efficace sur l'adventice ? Oui Non
 - A la dose utilisée, le produit devrait-il être efficace sur l'adventice ? Oui Non
 - Le produit utilisé est-il adapté au type de sol de la parcelle ? Oui Non
 - Le stade de l'adventice était-il conforme aux recommandations d'emploi ? Oui Non

- 
 - Les conditions météo avant, pendant et après traitement, étaient-elle favorables à la bonne performance du produit ? Oui Non

- 
 - La pulvérisation s'est-elle bien passée ? Oui Non
 - En cas de mélanges, les produits étaient-ils compatibles biologiquement ? Oui Non

- 
 - Observez-vous des symptômes de l'herbicide mais une reprise de croissance des adventices ? Oui Non
 - Observez-vous des individus de la même espèce contrôlés par l'herbicide ou des individus d'autres espèces contrôlés par l'herbicide ? Oui Non

Si la réponse à toutes ces questions est positive, la situation de résistance est envisageable. Pour en être sûr, il est possible de faire une analyse en laboratoire qui déterminera la présence ou non de résistance.

4. GESTION ET PRÉVENTION

Pour contrôler les adventices résistantes aux inhibiteurs de l'ALS (Groupe HRAC 2), il existe deux principaux leviers.

Agronomie

Adapter les pratiques agronomiques en fonction de leur impact sur l'adventice :

	Coquelicot	Matricaire	Stellaire	Séneçon
Labour	●	○	○	○
Faux semis	○	●	●	●
Semis tardif	●	○	●	○
Culture de printemps	●	○	●	○

Source : BASF

● efficace ● moyennement efficace ○ peu à pas d'effet

Diversifier, associer et alterner les modes d'action :

- Utiliser différentes substances actives efficaces sur dicotylédones, disponibles sur céréales, avec des modes d'action différents.
- Désherber dès l'automne avec des modes d'action efficaces.
- Profiter des autres cultures de la rotation, pour utiliser d'autres modes d'action disponibles.
- Utiliser les doses recommandées.



BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto-2030>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou <https://phytostimdata.com>. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 610CETE0925R. Septembre 2025.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.